

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

# カルシウム配合 ビタミンAD剤

# レオポンADα

第②類医薬品

## 特 長

丈夫な骨を作るには、カルシウムやリンとともにビタミンAとビタミンDが必要です。ビタミンAは骨を作る細胞の働きを促進し、ビタミンDはカルシウムの小腸からの吸収を助け、骨に働いて骨の形成を促進します。また、ビタミンAは粘膜の異常乾燥、角化を改善し、目の乾燥感（ドライアイ）に効果をあらわします。

発育期、妊娠中や出産前後の女性、食事が減り好みも淡白なものになりがちな老年期のカルシウム、ビタミンA、ビタミンDの補給に、レオポンADαがお役に立ちます。

## ⚠️ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。（妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。）
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ◇効能又は効果

骨歯の発育不良  
夜盲症（とり目）  
くる病の予防

次の症状の緩和：目の乾燥感

次の場合のビタミンADの補給：

妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期

## ◇用法及び用量

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	2 カプセル	1 回
5 歳以上15歳未満	1 カプセル	
5 歳未満	服用しないこと	

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ◇成分及び分量 2カプセル中

乳酸カルシウム水和物……370mg（カルシウム48.1mg）

ビタミンA油…………… 4mg〔ビタミンA 4000I.U.（国際単位）〕

コレカルシフェロール…… 10 $\mu$ g〔ビタミンD 400I.U.（国際単位）〕

添加物としてジブチルヒドロキシトルエン、トウモロコシ油、グリセリン脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有する。

## ◇保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お客様相談窓口 TEL 076-476-1111  
9:00～16:30（土、日、祝祭日は除きます。）



製造販売元  
**明治製薬株式会社**  
富山県滑川市の中川原77番地