

服用に当たって、この説明文書を必ず読んで下さい。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

漢方薬

# フジワ 八味丸 (八味地黄丸)

第2類医薬品

## 特 長

八味丸は、疲れやすくて、冷え性で、尿量が少なかったり、又は多かったり、口がかわいたりする方におすすめする漢方薬です。

## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないで下さい。

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ◇成分及び分量

1日量(60丸)中

- タクシャ末 .....0.67g
- ブクリョウ末 .....0.67g
- ポタンピ末 .....0.67g
- ケイヒ末 .....0.22g
- ジオウ末 .....1.77g
- サンシュユ末 .....0.89g
- サンヤク末 .....0.89g
- 加工ブシ末 .....0.22g

添加物としてハチミツ、セラックを含有する。

## ◇効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

- 疲れやすく・・・主に年齢的なもの(老化現象)や新陳代謝機能の衰えなどによる疲れ、老化現象によるかすみ目を訴える方。
  - 四肢が冷えやすく・・・手足が冷えやすい、あるいは足先がほてる方、また足腰に力が入らない、腰や足が痛む、あるいはしびれる方。
  - 尿量減少又は多尿・・・尿の回数が多いのに尿量の少ない方、又は全体的に排尿の量の少ない方、排尿のたびに尿の出が悪く尿が残る感じのする方、あるいは排尿が困難な方、これと逆に尿の量の多い方、特に夜間たびたび尿意を催す方。
  - ときに口渇・・・口がかわき、お茶や飲み物を多くとる方、あるいは口がかわき水を少しずつ何度もむ方。
  - かゆみ・・・老人などに見られる皮膚乾燥によるかゆみ。
  - 頻尿、むくみ・・・尿の回数の多い方、尿量あるいは排尿の異常によるむくみのある方。
- 上記のような症状がいくつかある方にこの薬は用いますが、全体的に言えば、下半身に力がなく息切れがしたり疲れやすく、また夜間排尿に起きるようなことのある老化現象に用います。

## ◇用法・用量

次の1回量を1日3回、白湯又は常水にて通常食間に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成 人 (15歳以上)	20 丸
15歳未満	服用しないこと

## ◇保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わったりします。)
- (4) 期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

明治製薬株式会社 お客様相談窓口 TEL 076-476-1111  
9:00～16:30 (土、日、祝祭日は除きます。)



発売元

**明治製薬株式会社**

富山県滑川市中川原77

製造販売元

**二反田薬品工業株式会社**

広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号